

## 蛇 菰 属 新 种

张 绍 云    谭 沛 祥

### NEW SPECIES ON GENUS BALANOPHORA

Chang Shao-yun    Tam Pui-cheung

#### 隐轴蛇菰 新种    图1

*Balanophora cryptocaudex* S. Y. Chang et Tam, sp. nov.

A *B. gracilis* Lec. plantis humilibus, scapis brevibus, squamato-bracteis generaliter congestis in multiseriatis, inflorescentiis squamato-bracteis dimidiis obsitis, maculinis conicis vel ovatis statim dignoscenda.

Planta parasitica. Rhizoma lobatum, 2.5—4.5cm longum, facie luteo-brunneum, dense verruculosum et disperse cinnereo-album stellato-lenticellatum, lobis vaginarum generaliter non manifestis. Scapus 1.2—1.5cm longus. Squamato-bracteae late ovato-triangulares, imbricatae et congestae in multiseriatis, inflorescentiis circa dimidia obsitae. Flores dioeci. Inflorescentia masculina conica vel ovata, 2—3cm longa, purpureo-rubra; flores circa 1 mm longi, lobis perianthii 5, oblongis, minutis, patentibus, synandrium brevi-cylindricum, 8—9mm longum, antheris 5, juxta positis hippocratiformibus, inflorescen-

\* 张绍云: 云南, 思茅中草药研究所 (Institute of Chinese Medicinal Herbs, Simao, Yunnan)

谭沛祥: 广东, 广州, 中国科学院, 华南植物研究所 (South China Institute of Botany, Academia Sinica, Guangzhou, Guangdong.)

ntia feminea depresso sphaerica, purpureo-rubra; flores feminei apetalii et acaeyculati ovariis ovoideis, pedibus manifeste pradtis; appendicibus claviformibus, apice truncatis.

Yunnan(云南): Ximeng Xian(西盟县) 1900 m, S. m., communis, 29 Nov. 1979, M. W. Ju (鞠明维) 0003 (Typus, in Inst. Chin Medic. Herbs Simao Jingdong Xian(景东县), Y. N. Chang(张以年) et X. X. Bai 0003 (parasitic on *Macranga indica* Wight),

寄生植物; 根状茎分裂(枝), 常近掌状, 长2.5—4.5厘米, 表面黄褐色, 密被山疣瘤和散生灰白色星芒状皮孔, 分枝顶端膨大, 近截形, 鞘裂片通常不明显。花茎粗短, 长1.2—1.5厘米。鳞苞片膜质, 约16片, 阔卵状三角形, 长1.8厘米, 宽2厘米, 顶端钝, 覆瓦状排列, 包着花葶和半遮盖着花序。花雌雄异株。雄花序圆锥形或卵形, 长2—3厘米, 宽约1.7厘米; 雄花密集, 长1毫米; 花梗长4.5—5毫米; 花被裂片5, 长圆形, 长6毫米, 开展或稍反曲; 聚合雄蕊短圆柱状, 长8—9毫米; 花药5枚, 并排, 马蹄形, 有长1毫米的柄; 雌花序扁球形, 紫红色, 直径1.5—2厘米; 雌花无花被, 子房密集, 微小, 卵圆形, 连花柱长0.6—0.8毫米, 有明显的柄; 附属物棍棒状, 长约1毫米, 顶端截形。

**思茅蛇菰 新种 图2**

*Balanophora simaoensis* S. Y. Chang et Tam, sp. nov.

*B. dioicae* R. Br. affinis, a qua imprimis differt floribus 5-meris, non 4-meris; androeceo oblongo, inflorescentia masculina elliptico-ovata et feminea depresso-sphaerica.

Planta parasitica, rhizomatibus rubro-luteis, lobatis, circa 10cm in diam., facie densissime granulato-verrucosis et manifeste cinereo-stellato-lenticellatis, in sicco rugosis. Scapus 4.5—7.5cm longus, purpureo-rubrus Squamoso-bracteae ovatae vel lato-ovatae, erubro-luteae. Flores dioicii. Inflorescentia masculina elliptico-ovata, circa 6.5cm longa, rubro-lutea. Flores masculini rubri, patentes, circa 1.2cm in diam., lobis perianthii 5, ellipticis, 5mm longis, synandrii oblongi, 4mm longi antheris 5, hippocratifformibus, luteis, inflorescentia feminea, compresso-sphaerica, circa 2.6cm alta, 3—3.5cm lata, flores feminei apetalii et acalycaulti; ovariis purpureo-rubris, densissime et minute, ovoideis, manifeste stipitatis, appendicibus co-

piosis, claviformibus, apice subtruncatis, basin versus acuminate, basi ovariis praeditis.

Yunnan (云南): Jingdong xian (景东县), in dense forest, rarely, 2 Nov. 1979, S. Y. Chang (张绍云) 0002 A (Typus, in Inst. Chin. Medic. Herbs Simao); idem. X. X. Bai 2—3A; Ximeng Xian (西盟县), 1950m. s. m., in damp valley, common, parasit icon *Sarcosperma arboreum* Hook. f. 12, Dec. 1980, S. Y. Chang 0032A, 0033—2A, 0031A; Zhenyuan Xian (镇沅县), 1570m, s. m., S. Y. Chang 0008A.

寄生植物；根状茎分裂，有时呈珊瑚状，直径约10厘米，表面密被颗粒小疣瘤和明显的星芒状皮孔，干时多皱褶。花茎长4.5—7.5厘米，紫红色。鳞苞片(10) 12—14枚，卵形或阔卵形，长(16—) 20—25厘米。花雌雄异株。雄花序椭圆状卵形，长约6.5厘米，红黄色；雄花红色，开展，直径约1.2厘米；花梗长8毫米；花被裂片5，椭圆形，长5毫米；聚药雄蕊长圆形，长4毫米，有柄；花药5，马蹄形，黄色；雌花序扁球形，直径3—3.5厘米，高约2.6厘米；雌花无花被；子房紫红色，密集，卵圆形，连花柱长1.2毫米，有明显的柄，着生于附属体基部，附属体多数，棍棒状，顶端近截形，向基部渐尖。

\_\_\_\_\_ . . . \_\_\_\_\_




图1 隐轴蛇菰 *Balanophora cryptocandex* S. Y. Chang et Tam: 1. 雄株; 2. 雌株; 3. 花蕾 (雄花); 4. 雄花展开示聚药雄蕊 (黄少容绘)。




图2 思茅蛇菰 *Balanophora simaoensis* S. Y.Chang et Tam. 1. 雄株；2. 花  
蕾（雄花）；3. 雄蕊（黄少容绘）。